

საქართველოს სსრ ცოცლის მიურნიობის სამინისტრო

მუცნიერებისა და პროპაგანდის მთავარი სამმართველო

$$\begin{array}{r} 48544 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

### რეპოზიციაცია

ხახვის თასლის ერთ ფილიფალში მიღების

ფ ვ ს ა ხ ე ბ

ხახვის თესლის მოყვანას მისდევს ჩვენი ქვეყნის ხახვის მწარმოებელი თითქმის ყველა რაიონი. იგი ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთ რაიონებში ძირითადად სამწლიანი, ხოლო სამხრეთში ორწლიანი კულტურის სახით მოჰყავთ.

ჩვენს პირობებში (სამხრეთი ზონა) ხახვი მოჰყავთ ორწლიანი კულტურის სახით: პირველ წელს თესლის თესვით იღებენ ბოლქვეს, ხოლო მეორე წელს ბოლქვების დარგვით — თესლს.

იმის გამო, რომ სათესლე ბოლქვების მიღება, მოსავლის აღება, დახარისხება, შენახვა, შემდეგ მისი დარგვა და თესლის მიღება საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, აგრეთვე თესლის მისაღებად ორი წელია საჭირო (სამხრეთ ზონაში), თესვის ვადების შერჩევით (როგორც ეს ჩატარებული ცდებით დადასტურდა), შესასაძლებელია ერთ წელიწადში დაბალი თვითორებულების ხახვის თესლის მიღება.

აგვისტოს შუა რიცხვებში ნათესი ხახვი ზამთარში შედის 4—5 ფოთლის ფაზაში. ზამთარში ხანგრძლივი დაბალი ტემპერატურის გავლენით მცენარე გადის იაროვიზაციის (განვითარების) სტადიას, გაზაფხულზე (მაისის თვიდან) გამოაქვს საყვავილე ღეროები და აგვისტოს დასაწყისში იძლევა სრულად მომწიფებულ თესლს.

აღნიშნული წესით ხახვის თესლის მოსავალმა ჰა-ზე შეადგინა 4,0 ც, ხოლო დარგული ბოლქვებიდან — 4,56 ც. 1 ც თესლს მიღებაზე კი თვითორებულებაში შეადგინა შესაბამისად 429,06 მან. და 1385 მან.

ერთ წელიწადში ხახვის თესლის მიღება შეიძლება, როგორც თბილისის საგარეუბნო ზონაში (როგორც ეს გარდაბნის რაიონის ულიანოვკის მეთესლების საბჭოთა მეურნეობაში შემოწმებით დატასტურდა), ისე აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობ სარწყავ ზონებში ზღვის დონედან 500 მ-მდე. ამისათვის საჭიროა: საადრეო კომბოსტოს, საადრეო კიტრის, საპარკე ლობიოს და საადრეო კარტოფილის მოსავლის აღების შემდეგ ნიადაგი გაიწმინდოს. შინამორბედი კულტურების ნარჩენებისაგან, 1 ჰა-ზე უნდა შევიტანოთ 40-50

ტ გადამწვარი ნაცელი. ან მინერალური სასუქები (თუ სასუქები / კულტურული მომზადებებისა და მოძღვრებებისა და მომზადებების შესახებ), კულტურული მოძღვრებისა და მომზადების შესახებ (მათ შორის მინერალური მოძღვრების შესახებ) უკეთესია ვეგეტაციის პერიოდში ორგანიზმის გამოყვების სახით მოკლეს. პირველი გამოყვება ტარდება 1—2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, მეორე 5—6 ფოთლის ფაზაში. გამოყვებას უნდა დაუკავშიროთ მორწყვა და კულტივაცია.

სასუქების შეტანის დროს უკეთესია თუ ვიხელმძღვანელებთ ადგილზე შედგენილი აგროქიმიური კარტოგრამებით.

სვნა უნდა ჩატარდეს 25—27 სე სიღრმეზე 10—15 დღით ადრე თესვამდე. თესვის წინ ტარდება ლრმა (10—12 სმ) კულტივაცია. იფარცხება გვარედინად და ითესება. ჰა-ზე საჭიროა 8—10 კგ თესლი. თესვის ჩატარება უმჯობესია მანქანით (სონ-2,8 სკოსშ-2,8), ფართო-მწკრივიან 45 სმ მწკრივთაშორისებით, ან ვიწრომწკრივიან 22,5 სმ-ის დაშორებით ხუთმწკრივიანი (22,5×4+56 სმ) ზოლების სახით.

მაღალი მოსავლის მიღების ერთ-ერთი ძირითადი პირობაა თანაბარი აღმონაცენის მიღება, რისთვისაც საჭიროა თესლის თესვის-თანავე რწყვის ჩატარება, ვეგეტაციის პერიოდში კი საჭიროა: ერთი ან ორი მარგვლის, გამეჩხრების (ორგერ), 2—3 კულტივაციის, 5—6 რწყვის ჩატარება. პროფილაქტიკის მიზნით ხახვის კრაქის წინააღმდეგ საჭიროა 1%-იანი ბორდოს ხსნარით შესხურება 2—3 ნამდვილი ფოთლის წარმოქმნიდან, ხოლო ფადმუოფობის გამოჩენისთანავე სისტემატურად.

გამეჩხრება ტარდება ორგერ: პირველი—2-3 ფოთლის ფაზაში მცენარეებს შორის 3—4 სმ-ის დატოვებით, მეორე—4—5 ფოთლის ფაზაში მცენარეებს შორის 10—15 სმ-ის დატოვებით. ამ დროს 22,5 სმ მწკრივთაშორისებით დათესილი ხახვი საფოჩედ აიღება მწკრივთვამოშვებით. დარჩენილი მწკრივები (45 სმ-ის დაცილებით); თუ საჭიროა კიდევ გამეჩხრდება. ამ მცენარეებიდან ვითარდება (მასისის თვიდან) საყვავილე ღეროები, რომელიც აგვისტოს დასაწყისში იძლევა სრულად მომწიფებულ თესლს. თესლის აღება ხდება შეჩერებით, დაუგვიანებლად.

აღნიშნული მეთოდით მიღებული თესლი საკუთრივ გარემონტი  
ხახვის ერთჯერადი წარმოებისათვის როგორც საფოჩედ, ისე საჭიროა  
ქონლო ბოლქვის მისაღებად.

აგვისტოს ვადაში ხახვის თესლით მიიღება აგრეთვე როგორც  
საგვიანო (ნოემბრის თვეში), ისე ზეადრეული (მარტის ავიდან)  
საფოჩე ხახვი, ე. ა. იმ პერიოდში, როდესაც ღია გრუნტიდან სხვა  
ბოსტნეული კულტურების მოსავალი მცირეა.



შეკვ. 1306

უ 91565

ტ. 500

გადაეცა წარმოებას 10/VII-77 წ. ხელმოჭერილია დასაბეჭდად 10/II-77 წ. ანაზობის  
ზომა 6X9,5. სასტამბო თაბაზი 0,5, ხალჩ.-საგამომცემლო თაბაზი 0,25

უ ფ օ ს ო

შრომის წითელი დროშის თრდენოსანი  
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სტამბა,  
თბილისი-31, დილომი.

Типография Грузинского ордена Трудового Красного Знамени  
сельскохозяйственного института, Тбилиси-31, Дилеми.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГССР

Главное управление науки и пропаганды

РЕКОМЕНДАЦИЯ  
к получению семян лука за один год

(На грузинском языке)

Составитель Ш. Х. Тандашвили

Тбилиси—1977

4848/69

